

Recomendações da SBACV para o manejo das emergências vasculares no período de pandemia de COVID-19:

1. Triagem para COVID-19 : Seguir o fluxograma de atendimento do Ministério da Saúde (1):

https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200210_N_EmktCoronaVirusFluxoV2_6121956549677603461.pdf

2. Procedimentos cirúrgicos em pacientes com suspeição clínica ou com diagnóstico de COVID-19 (nestes casos sugere-se proteção nível III) (2)

Níveis de proteção:

Nível de proteção	Equipamento de proteção	Âmbito de aplicação
Proteção nível I	Gorro cirúrgico descartável Máscara cirúrgica descartável Uniforme de trabalho Luvas de látex descartáveis ou roupas de isolamento descartáveis, se necessário	Triagem pré-exame Ambulatórios de atendimento clínico
Proteção nível II	Gorro cirúrgico descartável Máscara de proteção médica (N95) Uniforme de trabalho Uniforme de proteção descartável Luvas descartáveis de látex Óculos de proteção	Atendimento de pacientes febris Área de isolamento (incluindo UTI) Material de exame não respiratório de pacientes suspeitos / confirmados Realização de exames de imagem em pacientes suspeitos / confirmados Limpeza de instrumentos cirúrgicos utilizados em pacientes suspeitos / confirmados
Proteção nível III	Gorro cirúrgico descartável Máscara de proteção médica (N95) Uniforme de trabalho Uniforme de proteção descartável Dispositivos de proteção respiratória de face inteira ou respirador/purificador de ar motorizado	Procedimentos como: intubação oro e nasotraqueal, traqueostomia, broncofibroscopia, endoscopia gastroenterológica. Procedimentos onde os pacientes suspeitos / confirmados podem pulverizar ou espirrar secreções respiratórias ou fluidos corporais / sangue. Cirurgias/autópsias em pacientes confirmados / suspeitos

Como proceder para a utilização e retirada de vestimentas cirúrgicas:

1. Paramentação:

- a. Lavar as mãos.
- b. Vestir uniforme cirúrgico e calçados, preferencialmente impermeáveis.
- d. Colocar touca descartável
- e. Colocar máscara de proteção médica (N95).
- f. Colocar óculos de proteção.
- g. Assepsia das mãos.
- h. Calçar luvas descartáveis de nitrilo / látex.
- i. Colocar o avental impermeável
- j. Colocar óculos de proteção facial (recomenda-se que o mesmo seja colocado por terceiros).
- k. Calçar segunda luva.

Remoção:

- a. Retirar a luva externa.
- b. Remover óculos de proteção facial (o mesmo poderá ser removido por terceiros).
2. Remover o avental impermeável.
3. Remover os óculos de proteção e a depois a máscara, pela parte traseira da cabeça.
4. Remover a touca
5. Remover a luva interna.
6. Remover o uniforme cirúrgico e sapatos
7. Banho.

OBS: Recomenda-se após a remoção de cada peça que a luva interna seja lavada com água e sabão ou limpa com álcool gel.

Referências:

1. Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus (2019-nCoV) Ministério da Saúde Brasília-2020. Disponível em: https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200210_N_EmktCoronaVirusFluxoV2_6121956549677603461.pdf . Acessado em 20/03/2020
2. Tingbo L. Handbook of COVID-19 prevention and treatment. Disponível em: <https://covid-19.alibabacloud.com>. Acessado em 16/03/2020

São Paulo, 23 de março de 2020.

Dr. Bruno de Lima Naves
Presidente da Diretoria Nacional

Dr. Francesco Evangelista Botelho
Secretário Geral

Dr. Daniel Mendes Pinto
Tesoureiro Geral